Curilen®

Bisoprolol fumarate + Acetylsalicylic acid

Βισοπρολόλη
5 mg / 10 mg

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ
100 mg

UNI-PHARMA

Pharmaceutical Laboratories S.A.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S P C)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CURILEN® Καψάκια, σκληρά 5 mg/100 mg. CURILEN® Καψάκια, σκληρά 10 mg/100 mg. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 5 mg ή 10 mg Bisoprolol fumarate και 100 mg Acetylsalicylic acid. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Καψάκιο, σκληρό. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Θεραπευτικές ενδείξεις:** Για τη θεραπεία της υπέρτασης σε ασθενείς που είναι ήδη σταθεροποιημένοι με μονοθεραπείες. Για τη θεραπεία της στεβάσης σε ασθενείς που είναι ήδη σταθεροποιημένοι με μονοθεραπείες. **Δοσολογία:** Ένα καψάκιο ανά ημέρα. Η θεραπεία με bisoprolol δεν πρέπει να διακόπτεται απότομα καθώς κάτι τέτοια μπορεί να προκαλέσει προσωρινή επιδείνωση της πάθησης, ειδικά σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο. **Αντενδείξεις:** Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβιο θετρικό θεραπεία. Καρδιογενές σοκ. Κατά το θηλασμό. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο και κρίσεις άσθματος σε ασθενείς με ευαισθησία. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Πεπτικά, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, κάπνισμα, ζάλη, κεφαλαλγία, μειωμένη όραση ή ακοή, ανάμικτες κόκκινες κυτταρράξεις, γαστρίτιδα, δυσπεψία, ήπια συμπτώματα στο γαστρεντερικό σωλήνα. Δ.Τ. 5/100 mg: 8.36 €, 10/100 mg: 8.30 €.

Διαβάστε με γύναικ το φύλλακο πριν από τη χρήση και Απευθύνεται ΟΧΙ τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο ΠΑΝ και φύλλακο. Συσκευασία για 30 ΚΑΨΑΚΙΑ